

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
(Управление Роспотребнадзора по
Пермскому краю)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
614066, г. Пермь, ул. Мира, 66г
Тел./факс (8-342) 229-75-70
E-mail: perm_cto@mail.ru
ОКПО 75499052

15.12.2016г. № 17-01/3231

«Об усилении мероприятий по
недопущению завоза и распространения
кори на территории Пермского края»

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщает Вам об осложнении эпидемиологической ситуации по заболеваемости кори среди жителей Свердловской области. По данным на 12.12.2016г. в Свердловской области зарегистрировано 83 случая подозрения на корь. Среди них 53 ребенка и 30 взрослых. По состоянию на 12.12.2016г. лабораторно подтверждено 63 случая. В этой связи в Пермском крае сохраняется риск завоза и распространения коревой инфекции.


В целях профилактики завоза и распространения кори предлагаем Вам организовать размещение информации для населения о мерах ее профилактики (Приложение) в общедоступных местах (стенды, доски объявлений на территории населенных пунктов), а также на сайтах администраций.

Приложение: Памятка населению «Как защититься от кори?»

Начальник отдела

А.Б. Казаков

Главный специалист-эксперт
Рогожникова Л.С.
229-96-30



16.12.2016

Как защититься от кори?

В связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемости корью среди жителей Свердловской области, в нашем крае сохраняется риск завоза и распространения инфекции.

По данным на 12.12.2016г. в Свердловской области зарегистрировано 83 случая подозрения на корь. Среди них 53 ребенка и 30 взрослых. По состоянию на 12.12.2016г. лабораторно подтверждено 63 случая.

Корь – крайне заразное острое вирусное заболевание. Передается воздушно-капельным путем. При контакте с больным корью заболевают все неиммунные лица.

Основные симптомы: общее недомогание, повышение температуры, насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи, постепенно сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах. Самые серьезные осложнения включают поражения центральной нервной системы (энцефалиты, менингоэнцефалиты), тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония.

При появлении первых симптомов необходимо вызвать врача на дом; во избежание осложнений и предотвращения заражения членов семьи и соседей недопустимо отказываться от госпитализации.

Лечение: специфического лечения, направленного против вируса кори, не существует.

Профилактика: единственный способ защиты от инфекции - вакцинация.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок вакцинация против кори в плановом порядке проводится:

- Детям двукратно в возрасте 1 года и 6 лет

- Взрослым двукратно в возрасте с 18 лет до 35 лет (включительно), не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори.

Дополнительно двукратно иммунизируются лица в возрасте с 36 лет до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.

Иммунизация по эпидемическим показаниям в очагах кори проводится всем контактными лицам с 1 года и далее без возрастных ограничений, ранее не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о профилактических прививках против кори или привитым однократно.

Вакцина от кори – эффективный и иммунологически безопасный препарат.

Как узнать свой иммунный статус:

Необходимые сведения содержится в прививочном сертификате и медицинских документах, хранящихся в поликлинике по месту жительства.

Если у ребенка или взрослого нет ни одной прививки против кори, необходимо обратиться к врачу, при отсутствии противопоказаний поставить первую прививку против кори, через 6 месяцев поставить вторую прививку.

Если у ребенка старше 6 лет или взрослого поставлена только одна прививка против кори, необходимо поставить вторую прививку против кори.